

PROGRAMMI DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

REG. (UE) N. 611/2014 - REG. (UE) N. 615/2014

Annualità 2016/2017

AMBITO D'INTERVENTO B) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura
MISURA C) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale

NOTIZIARIO AGRO-METEOROLOGICO E BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 3 VALIDO DAL 15 LUGLIO AL 22 LUGLIO 2016

ANDAMENTO CLIMATICO SETTIMANALE

Una perturbazione atlantica, proveniente dalle regioni settentrionali ed in movimento verso il Centro-Sud della penisola italiana, sta portando con sé temporali che potrebbero esserci nel week end, generando un calo termico. Da domenica 17 luglio, con l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre, tornerà il bel tempo.

Il TEMPO Nel Salento instabilità nel week end con probabili piogge. Da domenica 17 luglio bel tempo e stabilità con temperature in ulteriore rialzo.

Il VENTO In rinforzo nel week end.



Fase fenologica dell'Olivo: Indurimento del nocciolo

Situazione Fitosanitaria

Rilevata la presenza di insetti lignicoli, attacchi di margaronia su impianti giovani, infezioni di agenti fungini (occhio di pavone, cercosporiosi, piombatura e lebbra). Accertata anche la presenza di Oziorinco che può essere controllato mediante l'applicazione di fasce di resinato sul tronco delle piante. Rilevata la mosca dell'olivo (*Bactrocera Oleae*) specialmente su cultivar a drupa medio-grossa,

PATOLOGIE E LINEE DI DIFESA



Occhio di Pavone (*Spilococea oleagina*)

Tale patologia non ha trattamenti specifici, ovvero può essere controllata mediante l'utilizzo di prodotti a base di **rame**, effettuando i trattamenti per il controllo delle altre malattie fungine.



Cercosporiosi (*Mycocentrospora cladosporioides*)

Si controlla mediante l'utilizzo di prodotti a base di **rame** effettuando il trattamento nelle giornate in cui si prevede che le condizioni del tempo siano stabili (assenza di vento e cielo sereno).



Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*; *C. acutatum*)

Ove si è accertata la presenza di tale malattia fungina, si consiglia di effettuare trattamenti con prodotti a base di **rame**. Un'alternativa è quella relativa all'impiego di prodotti a base di **Pyraclostrobin** (1 trattamento all'anno) da effettuare entro la fine di luglio.



Mosca (*Bactrocera Oleae*)

Si consiglia il monitoraggio dei voli con trappole a feromoni per il controllo degli adulti e un campionamento di olive per rilevarne l'ovo-deposizione. **Si raccomanda di NON EFFETTUARE trattamenti in maniera indiscriminata, ma solo quando la soglia di infestazione abbia superato il 10% per le olive da olio e il 5% per quelle da tavola. Visionare attentamente gli oliveti a drupa grossa, specie in prossimità della costa e negli oliveti irrigui; nel caso fosse necessario, intervenire con prodotti a base di Dimetoato, Fosmet, Imidacloprid e Spinosad.**

Per qualsiasi prodotto fitosanitario utilizzato prestare attenersi indicazioni riportate in etichetta e alle dosi indicate.



Margaronia (*Palpita unionalis*)

La Margaronia in questo stadio fenologico si manifesta con la formazione di un bozzolo sericeo sulla parte apicale del germoglio, erodendo la lamina inferiore delle foglie, con la formazione delle caratteristiche "rosure". Un forte attacco di Margaronia può causare gravi danni sulle giovani piante. Pertanto, si consiglia di trattare quest'ultime con prodotti utilizzati per il controllo della mosca. Nel caso di rilevamento di margaronia su impianti giovani è consigliabile intervenire con **Bacillus thuringiensis** se l'insetto è allo stadio larvale.



Cocciniglia Mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*)

Una forte infestazione di cocciniglia "*mezzo grano di pepe*" comporta spesso la presenza di fumaggine sulla vegetazione. Pertanto la lotta va diretta contro la cocciniglia nel periodo estivo, alla completa schiusura delle uova, che avviene con la comparsa delle neanidi. In caso di gravi infestazioni si consiglia di effettuare un trattamento fitosanitario con prodotti a base di **olio minerale estivo (bianco), Dimetoato o Fosmet.**